



**Para su publicación inmediata:**

2 de diciembre 2010

## **Preguntas y Respuestas Sobre La Exposición de Hepatitis A en Jerry's Deli en Westwood**

**1. ¿Cuántas sucursales de Jerry's Deli son afectados? ¿Cuántos empleados se ven afectados?**

Sólo un empleado en Jerry's Famous Deli, ubicado en 10925 Weyburn Ave, Westwood fue diagnosticado con hepatitis A en noviembre. No hay otros establecimientos afectados.

El Jerry's Deli ubicado en Westwood, no se ha cerrado, y no hay ninguna razón para no comer en este establecimiento. El equipo de Salud Pública ha inspeccionado cuidadosamente el restaurante y las prácticas de seguridad alimenticias del restaurante son de alta calidad. Además, Salud Pública continúa trabajando con la administración de Jerry's Deli para evitar la propagación de esta enfermedad.

El empleado diagnosticado con la hepatitis A ya no es contagioso. No hay riesgo para personas que comieron bocadillos o otros alimentos preparados en Jerry's Deli en Westwood después del 24 de noviembre.

**2. ¿Cuáles comidas en el menú se ven afectados?**

Sólo bocadillos, el empleado diagnosticado con hepatitis A preparaba los bocadillos que se sirvieron en el restaurant o a domicilio. No hay otra comida en el menú que este afectada.

**3. Me comí un bocadillo en la sucursal de Westwood. ¿Qué debo hacer?**

Las personas necesitan recibir una inyección de inmunoglobulina (IG) o una vacuna contra la hepatitis A entre los primero 14 días después de haber comido bocadillos o pidieron bocadillos a domicilio de Jerry's Deli en Westwood en las siguientes fechas:

- Los que comieron el 18 de noviembre necesitan recibir su inyección antes del 2 de diciembre.
- Los que comieron el 21 de noviembre necesitan recibir su inyección antes del 5 de diciembre.
- Los que comieron el 23 de noviembre necesitan recibir su inyección antes del 7 de diciembre.
- Los que comieron el 24 de noviembre necesitan recibir su inyección antes del 8 de diciembre.
- No hay riesgo para las personas que comieron alimentos preparados **después** del 24 de noviembre.



**4. ¿Dónde puedo conseguir la inyección de IG o la vacuna contra hepatitis A?**

La inyección de IG o la vacuna, se pueden obtener por medio de médicos particulares, clínicas medicas o de salud pública, y las salas de emergencias. Una lista de los centros de salud pública que ofrecen la inyección de IG o la vacuna contra hepatitis A entre el 2-8 de diciembre se pueden encontrar visitando [www.publichealth.lacounty.gov](http://www.publichealth.lacounty.gov).

No se necesita una inyección de IG si las personas han sido vacunadas contra la hepatitis A o han recibido la inyección de IG en los últimos tres meses, o si las personas han recibido una confirmación de la infección por el virus de hepatitis A. Ellos ya son inmunes a la hepatitis A.

**5. ¿Y si comi en Jerry's Deli antes del 18 de diciembre?**

Las personas que comieron bocadillos de Jerry's Deli ubicado en Westwood entre el 12 -18 de noviembre pueden haber sido expuestos a la hepatitis A, pero ya es demasiado tarde para recibir una inyección de IG o la vacuna para prevenir la enfermedad. Si usted sufre de alguno de los síntomas de la hepatitis A, por favor, comuníquese con su médico.

**6. ¿Que es la hepatitis A?**

La hepatitis A es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A se propaga por contacto físico y por la contaminación fecal de alimentos o bebidas.

**7. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?**

Las personas con la infección del virus de la hepatitis A pueden no presentar signos o síntomas de la enfermedad. Las personas mayores tienen más probabilidad de presentar síntomas que los niños. Si los síntomas están presentes, estos usualmente ocurren precipitadamente y pueden incluir:

- fiebre
- cansancio
- pérdida del apetito
- náusea
- cólicos estomacales
- orina de color oscuro
- ictericia (coloración amarillenta de piel y mucosas)

Los síntomas usualmente duran menos de 2 meses, algunas personas permanecen enfermos por 6 meses.

**8. ¿Cómo puedo saber si tengo hepatitis A?**

Es necesaria una prueba de sangre (IgM anti-VHA) para diagnosticar la hepatitis A. Esta prueba será positiva si estuvo expuesto recientemente a la infección.



**9. ¿Cómo se puede prevenir la hepatitis A?**

Lavándose bien las manos con jabón y agua caliente después de ir al baño, después de cambiar un pañal o antes de cocinar y comer alimentos.

**Para mayor información sobre la exposición de la hepatitis A en el Jerry's Deli, de Westwood, visite el sitio de Internet de Salud Pública al [www.publichealth.lacounty.gov](http://www.publichealth.lacounty.gov).**

###