




That sore might be **SYPHILIS**

Syphilis and other STDs are on the rise in LA County
GET FACTS. GET TESTED. GET CURED.
Free & confidential testing & information:
1-800-758-0880 • www.getprotectedla.com/stds



SYPHILIS SYMPTOMS

- The first symptom is a painless sore that may appear inside or near the mouth, genitals or anal areas.
- A second symptom may be a rash that appears on the palms of hands, bottom of feet, or on the body between the armpits and upper thighs.
- Syphilis symptoms may appear and disappear.
- To cure syphilis medical testing and treatment are required.



TEST TODAY

- If experiencing signs or symptoms
- If being tested for other STDs
- If sexually active
- If engaging in unprotected sex
- If you have multiple sex partners
- If you are a man having sex with other men (testing recommended every 3-6 months)
- If you plan to get pregnant in the future

**Find
a clinic**



SYPHILIS IN WOMEN

- Syphilis in women is increasing in Los Angeles County.
- If a woman is infected with syphilis while pregnant, it can lead to birth defects, miscarriage, premature birth or stillbirth.
- **Good News:** Syphilis can be treated and cured even during pregnancy with a shot of antibiotics.



IF YOU ARE PREGNANT:

- Prenatal care is very important to keep you and your baby healthy.
- You should be tested for syphilis 3 times during your pregnancy: during the 1st trimester, early in the 3rd trimester (between 28-32 weeks) and at delivery.
- If you don't have a regular doctor, call the free STD hotline **(800) 758-0880** to find out where to get tested and treated for free.

SÍNTOMAS DE SÍFILIS

- El primer síntoma es una llaga sin dolor que puede aparecer dentro o cerca de la boca, genitales o áreas anales.
- Un segundo síntoma puede ser una erupción que puede aparecer en las palmas de las manos, en la planta de los pies o en el cuerpo entre las axilas de los brazos y la parte superior de los muslos.
- Los síntomas de la sífilis pueden aparecer y desaparecer.
- Para curar la sífilis, se requieren exámenes médicos y tratamiento.



HASTE LA PRUEBA HOY

- Si experimenta signos o síntomas
- Si se está probando para otras ETS
- Si es sexualmente activo
- Si tiene relaciones sexuales sin protección
- Si tiene múltiples parejas sexuales
- Si eres un hombre que tiene sexo con otros hombres (se recomienda hacerse la prueba cada 3-6 meses)
- Si planeas quedar embarazada en el futuro

Encuentre una clínica



SÍFILIS EN MUJERES

- La sífilis en mujeres está aumentando en el condado de Los Angeles.
- Si una mujer está infectada con sífilis durante el embarazo, puede conducir a defectos de nacimiento, aborto espontáneo, nacimiento prematuro o muerte fetal.
- **Buenas noticias:** la sífilis se puede tratar y curar incluso durante el embarazo con una inyección de antibióticos.



SÍ ESTAS EMBARAZADA:

- La atención prenatal es muy importante para mantener a usted y a su bebé saludables.
- Debe hacerse la prueba de sífilis tres veces durante su embarazo: durante el primer trimestre, a principios del tercer trimestre (entre 28-32 semanas) y en el momento del parto.
- Si no tiene un médico regular, llame a la línea gratuita de ETS **(800) 758-0880** para averiguar dónde hacerse la prueba y recibir tratamiento gratis.

Esa llaga podría ser

SÍFILIS

Los casos de Sífilis y otras ETS están en aumento
INFÓRMATE. HASTE LA PRUEBA. CURATE.
Información y pruebas gratis y confidenciales:
1-800-758-0880 • www.getprotectedla.com/stds

