

តើផលិតផលនៃឱសថមួយចំនួនដែលអាចកើតមានចំពោះការឆ្លងរោគរបេង (TB) នោះមានអ្វីខ្លះ?

ផលិតផលនៃថ្នាំគ្រាប់កម្រកើតមានណាស់ តែអាចនឹងរួមមាន:

- ការចងក្រង
- ក្អក
- ទឹកនោមឡើងក្រមៅ
- ការឡើងក្រហមលើស្បែក
- ស្បែក និង/ឬភ្នែកឡើងលឿង
- អត់ឃ្លានចំណីអាហារ
- ស្លឹកដៃ និង/ឬប្រអប់ជើង

បើអ្នកប្រឈមនឹងផលិតផលនៃឱសថមួយចំនួនដែលអាចកើតមានចំពោះការឆ្លងរោគរបេង (TB) អស់ទាំងនេះ ចូរច្រាបជាបន្ទាន់ទៅវេជ្ជបណ្ឌិត, គិលានុប្បដ្ឋាក, ឬគ្រូពេទ្យគំហែទៅសុខភាពជំនាញរបស់អ្នកដែលមកពីក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ។

តើក្រសួងសុខភាពសាធារណៈដើរតួនាទីអ្វីខ្លះ?

ក្រសួងនេះមានកង្វល់អំពីអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក និងផ្តល់ការព្យាបាលសម្រាប់ការឆ្លងរោគរបេង (TB)។ បើអ្នកទទួលបានការព្យាបាលតាមរយៈអង្គការសុខភាពសាធារណៈ គ្រូពេទ្យ ឬគិលានុប្បដ្ឋាកដែលបំពេញតួនាទីផ្សព្វផ្សាយបន្ថែម (ERN) អាចនឹងជួបអ្នក។ ក្រុមពេទ្យ ERN គឺជាគិលានុប្បដ្ឋាកដែលទទួលបានការចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជាពិសេសក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកជម្ងឺឆ្លងរោគរបេង (TB) ឬមានកំពុងមានជម្ងឺរបេង (TB)។ មានតែក្រសួងសុខភាពសាធារណៈនៃខោនធីឡូសអង់ដេឡែសប៉ុណ្ណោះដែលផ្តល់សេវាកម្មនេះ។

តើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ រវាងការឆ្លងរោគរបេង (TB) និងរោគរបេង (TB) សកម្ម (កំពុងកើតមាន)	
ការឆ្លងរោគរបេង (TB)	រោគរបេង (TB) សកម្ម
គ្មានរោគសញ្ញា	ក្នុងខ្លាំងរយៈពេលចាប់ពី 3 សប្តាហ៍ឡើងទៅ
គ្មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនកំពុងមានជម្ងឺ	ក្នុងក្តៅកាយ
លទ្ធផលធ្វើតេស្តស្បែក ឬឈាមវិជ្ជមាន ឬរកឃើញមាន (តាមធម្មតា)	លទ្ធផលធ្វើតេស្តស្បែក ឬឈាមវិជ្ជមាន ឬរកឃើញមាន (តាមធម្មតា)
ការថតកាំរស្មីអ៊ិចលើទ្រូងមានលទ្ធផលដូចប្រក្រតី (តាមធម្មតា)	ការថតកាំរស្មីអ៊ិចលើទ្រូងមានលទ្ធផលមិនប្រក្រតី (តាមធម្មតា)
មិនអាចឆ្លងរាលដាលមេរោគរបេង (TB)	មិនសូវឃ្លានអាហារ
អាចមានកំណើនមេរោគរបេង (TB) ដែលសកម្ម បើការព្យាបាលមិនចប់ចុងចប់ដើម ឬមិនពេញលេញ។	ចុះខ្សោយ, ចុះក្បាល ឬអស់កម្លាំង គ្រុនដា, ក្តៅខ្លួន, បែកញើសពេលយប់
	ស្រែកទម្ងន់

ការឆ្លងរោគរបេង (TB)



អ្វីៗដែលអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ



សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីជម្ងឺ/រោគរបេង (TB) ចូរមើលវិបសាយ www.publichealth.lacounty.gov/tb

តើអ្វីទៅជាការឆ្លងរោគរបេង (TB)?

បើអ្នកមានឆ្លងរោគរបេង (TB) មេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) ប្រាកដជាមានតែ "សម្ងំ" នៅក្នុងខ្លួនអ្នក។ បើអ្នកមានឆ្លងរោគរបេង (TB) អ្នកនឹងមិនមានអាការៈរោគ/រោគសញ្ញា មិនគិតថាខ្លួនឈឺ និងមិនអាចចម្លងមេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) ទៅអ្នកមនុស្សផ្សេងទៀតបានទេ។ លើសពីនេះ បើប្រព័ន្ធសុំជម្ងឺអ្នកចុះខ្សោយ មេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) ទាំងនេះអាចនឹង "ងើបឡើង" ហើយនឹងកើនចំនួន។ នៅពេលនោះ អ្នកអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារមានមេរោគរបេង (TB) មានលក្ខណៈសកម្ម។ បើអ្នកកំពុងមានជម្ងឺរបេង (TB) អ្នកមានរោគសញ្ញាដូចជា ក្អកក្អង បែកញើសយប់, ចុករយ ឬអស់កម្លាំង, និងស្រកទម្ងន់។ លើសពីនេះទៀត អ្នកអាចចម្លងមេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) ទៅអ្នកមនុស្សផ្សេងទៀតបាន។ មេរោគរបេង (TB) មានផលប៉ះពាល់ជាសំខាន់ទៅលើសួត តែវាក៏ប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយដែរ។ បើបណ្តោយទុកដោយគ្មានការព្យាបាល មេរោគរបេង (TB) អាចនឹងនាំទៅដល់សេចក្តីស្លាប់បាន។

តើមនុស្សម្នាក់ឆ្លងមេរោគនេះតាមរបៀបណា?

មេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) មានជ្រៀតចូលទៅក្នុងខ្យល់ នៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងមានជម្ងឺរបេង (TB) នេះក្អក, កណ្តាស, សើច, និយាយ, ឬច្រៀង។ បកអ្នកដកដង្ហើមស្របខ្យល់ដែលមានមេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) អ្នកអាចនឹងឆ្លងរោគនេះបាន។ យ៉ាងណាម៉ិញ អ្នកមិនអាចឆ្លងរោគរបេង (TB) ពីតាមសម្លៀកបំពាក់, បាន, ចំណីអាហារ, ក្រែកដេក, ឬការប៉ះពាល់ខ្លួនប្រាណផ្ទាល់មនុស្សដែលកំពុងមានជម្ងឺរបេង (TB) បានទេ។



តើគេព្យាបាលរោគរបេង (TB) យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

បើអ្នកមានឆ្លងមេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) អ្នកអាចនឹងកើតរោគរបេង (TB) នេះបាន។ បញ្ហានេះអាចកើតមានឡើងក្លាមៗ ឬជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកទៀត។ គេអាចព្យាបាលរោគរបេង (TB) នេះបានដោយប្រើឱសថដែលជាញឹកញាប់គេប្រើប្រភេទថ្នាំ Isoniazid។ អ្នកត្រូវតែលេបថ្នាំនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេលពីប្រាំមួយទៅប្រាំបួនខែ។ លើសពីនេះ មានរយៈពេលខ្លីជាងមួយ គីរបអាហារដែលលាយជាមួយថ្នាំចំនួនពីរប្រភេទដែលគេប្រើប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់រយៈពេល 12 អាទិត្យ។

តើហេតុអ្វីទើបបានជាខ្ញុំត្រូវប្រើថ្នាំ បើកខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ថាធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះ?

អ្នកអាចនឹងមានកំណើនមេរោគរបេង (TB) ដែលសកម្មនៅក្នុងខ្លួន បើអ្នកមិន

ប្រើថ្នាំសម្រាប់ការឆ្លងមេរោគរបេង (TB) ទេនោះ។ មានមេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) ជាច្រើនដែលត្រូវបានសម្លាប់ នៅបន្ទាប់ពីអ្នកបានចាប់ផ្តើមការប្រើថ្នាំ តែមួយចំនួនទៀតនៅរស់ក្នុងខ្លួនអ្នករយៈពេលយូរ។ ដរាបណាអ្នកនៅមានមេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) នៅក្នុងខ្លួនអ្នកកំពុងអាច "ងើបឡើង" បង្កើនចំនួន និងធ្វើឱ្យអ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាន។ បើអ្នកកំពុងប្រើ ឬលេបថ្នាំរបេង (TB) រាល់ខែនោះ អ្នកត្រូវប្រើថ្នាំនោះឱ្យអស់ នៅពេលដែលវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្យកំហែទាំសុខភាពអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាឱ្យ។

តើខ្ញុំអាចប្រាប់ដូចម្តេចបាន បើខ្ញុំមានជម្ងឺរបេង (TB)?

ធ្វើតេស្តស្បែក ឬឈាមរកមើលមេរោគរបេង (TB) បើអ្នកបានធ្វើតេស្តស្បែក ឬធ្វើឱ្យប្រាកដប្រជាថា អ្នកបានត្រឡប់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកវិញ ក្រោយរយៈពេលពីរថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នក។ បើអ្នកបានធ្វើតេស្តឈាម អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការត្រឡប់ទៅគ្រូពេទ្យដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលធ្វើតេស្តរបស់អ្នកទេ។

តើវានឹងយ៉ាងម៉េចដែរ បើការធ្វើតេស្តស្បែក ឬឈាមមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន (រកឃើញមាន)?

ការធ្វើតេស្តស្បែក ឬឈាមមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន (រកឃើញមាន) តាមធម្មតាមានន័យថា អ្នកបានឆ្លងមេរោគ ឬ អតិសុខុមប្រាណរបេង (TB) រួចហើយ តែវាមិនមានន័យសំខាន់ចាំបាច់ដែលថា អ្នកកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ឬមានមេរោគរបេង (TB) ដែលសកម្មនោះទេ។ ការធ្វើតេស្តផ្សេងទៀតដែលមានប្រភេទដូចជា ការថតកាំរស្មីអ៊ិចឈឺទ្រូង (chest X-ray ឬសំណាកកំហាក (phlegm) មិនចាំបាច់ត្រូវមានដើម្បីពិនិត្យរកមើលឱ្យឃើញនោះទេ បើអ្នកកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ឬមានមេរោគរបេង (TB) ដែលសកម្ម។

តើខ្ញុំគប្បីត្រូវធ្វើតេស្តស្បែក ឬឈាមនៅពេលណា?

- អ្នកគប្បីទទួលបានការធ្វើតេស្តរកមើលមេរោគរបេង (TB) ក្នុងករណីដែលអ្នក៖
- មានរោគសញ្ញាថាកំពុងមានជម្ងឺរបេង
- បានចំណាយពេលនៅជាមួយនិងមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងមានរោគរបេង (TB)
- មានប្រព័ន្ធសុំជម្ងឺចុះខ្សោយ ដូចជា ហ៊ីវ (HIV) ឬទឹកនោមផ្អែម
- បានចាក់បញ្ចូលថ្នាំញៀនខុសច្បាប់
- បានមក សអរ ថ្មី ដោយចេញពីអាមេរិកឡានីន, តំបន់សមុទ្រការីប៊ីន, ទ្វីបអាហ្វ្រិក, ទ្វីបអាស៊ី, ឬអឺរ៉ុបខាងកើត
- បានធ្វើការ ឬរស់នៅមន្ទីរព្យាបាលរោគ, ជម្រកអ្នកគ្មានផ្ទះសំបែង, ពន្ធនាគារ, ឬកន្លែងរស់នៅជាក្រុមផ្សេងទៀត។