

**NALOXONE-Ը
ԿԱՐՈՂ Է ՓՐԿԵԼ
ԿՅԱՆՔ**

**Ինչ պետք է իմանաք
Naloxone-ի մասին.**

- Այն դեղամիջոց է, որն օգտագործվում է օփիոիդային գերդոզավորման հետևանքները ժամանակավորապես վերացնելու համար:
- Այն վնասակար չէ, եթե տրվում է ափիոնանման նյութերի գերչափաքանակ չօգտագործող կամ ընդհանրապես մեծ չափաքանակ չընդունող անձի:
- Չի փոխազդում դեղերի հետ և չունի մահացու չափաքանակի սահմանափակում:
- Չի կարող առաջացնել գերդոզավորում և Չի առաջացնում կախվածություն:
- Ազդեցությունն անցնում է 30-ից 90 րոպեի ընթացքում, հետևաբար գերդոզավորման վիճակը կարող է վերադառնալ:

Դուք կարող եք ձեռք բերել Naloxone-ն անմիջապես դեղատնից կամ համայնքային կազմակերպություններից:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք Ապահով և Ակտիվ Համայնքների Մասնաճյուղ՝ www.cdph.ca.gov:

**Եթե ձեզ, ձեզ
մտերիմ կամ
ծանոթ անձին
անհրաժեշտ է
բուժում,
զանգահարեք
մեզ ցանկացած
պահի՝ 24/7:**

**ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՍՐԱՇԱՀՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕՍՆՈՒԹՅԱՆ ՂԻԾ**

1.844.804.7500

**Բուժումը և
Ապաքինումը
Հնարավոր են:**

**Դուք կարող
եք Փրկել
Կյանք:

ԱՌԱՋԻՆ
ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԴՈՋԱՎՈՐ
ՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿ**

SAPC | Substance Abuse Prevention and Control



County of Los Angeles
Public Health



**ՂՄԱՆ
ԼԻԾՈՂՄՈՒԹՅԱՆ
ՈՋԽՅՂԿ Ի
ՄՐԱՍԱՆԻՄՈՒԵԱՆԱԿԻ
ՂՎՈՒՆԱՎՓԻՆ
ԼԻՅՄՈՂՄՅ ՈՋԽՅՂԿ**

Անձի հնարավոր գերդոզավորման նշանները

Շնչառության բացակայություն կամ մակերեսային շնչառություն:



Կլկլոց կամ բարձր խոնկոց:



Կպչուն և սառը մաշկ:



Արթնանալու կամ խոսելու անկարողություն:



Կապույտ շուրթեր և եղունգներ:



Փոքրացած բիբեր:



Ինչ անել՝




Թափահարել և բղավել:



ԶԱՆԳԱՅԱ ՐԵԼ 911:



Արձագանքի բացակայության դեպքում naloxone-ի չափաբաժինն ամբողջությամբ ցողել մեկ քթանցքի մեջ:



2-5 րոպե արձագանքի բացակայության դեպքում երկրորդ չափաբաժինն ամբողջությամբ ցողել մյուս քթանցքի մեջ:



Ստուգել շնչառությունը:



Կատարել արհեստական շնչառություն և անձին կողաշրջել (վերականգնման դիրք):



Սպասել անձի հետ մինչև օգնության ժամանումը:

Արհեստական Շնչառություն




- 1 Անձին պառկեցնել մեջքի վրա:
- 2 Բարձրացնել կզակը՝ շնչուղիները բացելու համար:
- 3 Ստուգել՝ արդյոք բերանի մեջ որևէ բան կա, եթե կա, մաքրել այն:
- 4 Սեղմել քիթը, բերանով հավել նրա բերանին, երկու անգամ շնչառություն տալ:
- 5 5 վայրկյան հետո նորից շնչառություն տալ:
- 6 Յուրաքանչյուր 5 վայրկյանը մեկ շնչառություն տալ:

Վերականգնման Դիրք



- 1 Անձին կողաշրջել:
- 2 Գլուխը պետք է մի փոքր հետ լինի, որպեսզի շնչուղիները բացվեն:



- 3 Ձեռքով պահեք գլուխը:
- 4 Ծնկով պահել այնպես, որ մարմինը չըջվի որովայնի վրա: